

果樹(果物)

作物	エキス				粉末
	使用期間	使用目的	使用濃度	回数	使用方法
ブドウ 	新梢伸長期	新梢の充実	葉面散布: 500~800倍 かん水: 300~500倍	1~2回	使用量:80~100g/年間単肥施用(春・秋肥) 1.全面施用 2.穴あけによる 3.中耕、すき込み混用 1.堆肥混用 2.元肥混用 3.ボカシ肥料原料
	開花~肥大期	開花揃、 花ぶるい防止		1~2回	
	果実肥大期	果実肥大、増糖		2~3回	
	着色期	着色促進		1~2回	
柑橘類(かんきつ) 	春芽伸長期	萌芽揃、樹勢強化	葉面散布: 500~800倍 かん水: 300~500倍	1~2回	
	開花~肥大期	開花揃、落果防止		1~2回	
	果実肥大期	肥大促進、 着色促進		4~5回	
	(7~9月)	糖度向上		—	
リンゴ、カキ、モモ、 サクランボ等の落葉果樹 	開花期	新梢の伸長促進と 充実	葉面散布: 500~800倍 かん水: 300~500倍	1~2回	
	適果期	果実の肥大促進		2~3回	
	果実肥大期	糖度向上、 着色促進		3~4回	
ナシ(円谷会) 	発芽期 (2月~発芽直前)	遅霜対策	葉面散布:800倍	1回	
	交配後(4月)	新梢の伸長促進と 充実		1回	
	(5月)	落果防止、 果実肥大		2回	